

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fundet ved kloakreovering i Korsbrødregade, Ribe

af
Orla Hylleberg Eriksen



RIBE AMT

Korsbrødregade

19.04.06 Ribe sogn

Undersøgelse af tømmer fra kloakreovering

Koordinater: (WGS84) 55.32927°N/8.79160°E

Formål: Datering og opbygning af grundkurve.

Indsendt af Sydvestjyske Museer ved Troels Bo Jensen.

Indsamling af prøver: Troels Bo Jensen.

Laboratorieundersøgelse: Orla Hylleberg Eriksen.

Indsenders J.nr.: SJM 799

Rapport udarbejdet: November 2018.

NNU j.nr. A9587

Publicering:

Med mindre andet er aftalt kan resultatet frit anvendes med henvisning til NNU rapport 77, 2018 af Orla Hylleberg Eriksen. Kontakt evt.

laboratoriet for hjælp og yderligere oplysninger (dendro@natmus.dk).

Rapporten kan downloades fra hjemmesiden

natmus.dk/organisation/bevaring-naturvidenskab/miljoearkaeologi-materialeforskning/dendrokronologi/dendrokronologisk-rapportoversigt/rapportoversigt-2018/ (eller mirror-site nnuweb.dk) under Dendrokronologi, Rapporter.

Tømmer fra kloakreovering

Ni prøver af eg (*Quercus* sp.) er undersøgt. Syv prøver er dateret. Én prøve er ikke målt, da den kun omfatter 27 årringe. Der er splintved bevaret på fem af prøverne, heraf har to Waldkante (sommerfældning og vinterfældning). Prøverne er udtaget som skiver. På grundlag af den dendrokronologiske undersøgelse, kan de daterede prøver deles op i to grupper, samt en enkelt prøve, som er den ældste.

Ældste prøve


71290099. Yngste bevarede årring er dannet i 1178. Prøven omfatter seks splintårringe. Efter tillæg af årringe i det manglende splintved, kan det beregnes, at træet, som prøven stammer fra, er fældet ca. 1187 e.Kr. Splintstatistik for yngre træer er anvendt her.

Næstældste gruppe


Består af 71290059, 71290069 og 71290079. To prøver har splintved bevaret, heraf har 71290069 fuld splint - vinterfældning. Yngste fuldstændig bevaret årring på 71290069 er dannet i 1218 e.Kr. Træet, som prøven stammer fra, er fældet i vinterhalvåret 1218/19 e.Kr. Tolking: Denne datering kan også gælde de andre prøver i gruppen.

Yngste gruppe

Består af 71290029, 71290039 og 71290049. To af prøverne har splintved bevaret. Heraf har 71290049 fuld splint. Prøven omfatter 10 splintårringe, samt en ufuldstændig splintårring (sommerfældning). Træet, som prøven stammer fra er fældet i vækstsæsonens start 1225 e.Kr. Tolking: Denne datering kan og så gælde de andre daterede prøver i gruppen.



Tegnforklaring:



Kurverne fra de daterede prøver er sammenregnet til en middelkurve (7129M005) på 203 år, som dækker perioden 1022-1224 e.Kr.

A9587 Korsbrødregade - Krydsdateringer med referencekurver	
	7129M005
Sjælland, 2X900001	6.14
Vest Danmark 01, Vest Danmark 01	8.96
Slesvig-Holsten, DM100003	3.39
Sydvestskåne, SM000001	4.56
Ribe Domkirkeplads, 7095m004	7.08
Riberhus slotsbanke, 7097m002	7.37

Splintstatistikker:

Unge træer (lav egenalder, 30 - ca. 70 år): 15 [-5, +10] år. (anvendt her)

Ældre træer (høj egenalder, fra ca. 70 år): 20 [-5, +10] år. (anvendt her)

For *t*-værdier se Baillie & Pilcher, 1973.

A9587 Korsbrødregade, Ribe, SJM 799 - Katalog									
Unders nr.	Beskrivelse	År	Marv	Splint	Slutring	Synkron position	Fældning	Bem.	
	Tømmer								
71290019	Pr.1, Stolpe 1, felt M1	27 årringe - ikke målt!							
71290029	Pr.2, Planke 1, felt M1	196	?	nej	H1	1022-1217	efter ca. 1237		
71290039	Pr.3, Planke 2, felt M1	175	?	nej	H1	1039-1213	efter ca. 1233		
71290049	Pr.4, Stolpe 2, felt M1	54	ja	10 år	W sf	1171-1224	1225	*	
71290059	Pr.5, Stolpe 5, felt M1	66	2-3 cm	nej	H1	1141-1206	efter ca. 1221	*	
71290069	Pr.6, Stolpe 6, felt M1	44	ja	10 år	W vf	1175-1218	1218/19		
71290079	Pr.7, Stolpe, felt M2	50	ja	7 år	S1	1163-1212	ca. 1220		
71290089	Pr.8, opgravet stolpe, felt M2	92	ja	27 år	S1		ikke dateret		
71290099	Pr.9, Stolpe, felt M3	34	ja	6 år	S1	1145-1178	ca. 1187	*	
<small>Tegnforklaring: B - bark, W - waldkante (barkring), vf - vinterfældning, sf - sommerfældning, Hx - Heartwood (kerneved) x = antal, Sx - Sapwood (splintved) x = antal. Hx og Sx angiver årringe, som ikke er inkluderet i rubrikkerne År og Splint. H/S angiver Heartwood/Sapwood grænse. * 4-årrig rytme observeret i årringforløbet.</small>									

Generelt om dendrokronologiske undersøgelser

Undersøgelsen foretages på et tværsnit af træprøven, hvor målebanerne tildannes ved hjælp af en barberbladskniv. Ved undersøgelsen anvendes et mikroskop med forstørrelse på ca. 10 - 40 gange samt en målemaskine til datafangst.

Årringene i den enkelte prøve måles normalt mindst to gange, helst på to forskellige målebaner. Årringskurven for de enkelte radier tegnes for visuel kontrol af målingerne for den enkelte prøve. Efter eventuelle rettelser/korrektioner regnes de to radier sammen til den kurve, som repræsenterer prøven. Kurverne søges synkroniseret relativt og der beregnes eventuelt én eller flere middelkurver (lokalitetskronologier). Såvel enkeltkurver som eventuelle middelkurver søges dateret ved hjælp af allerede udarbejdede grundkurver ("masterkronologier"). Det dendrokronologiske Laboratorium ved Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser har udarbejdet et grundkurvekomplex (flere lokale grundkurver) for egetræ, som dækker perioden fra nutiden og tilbage til ca. 100 f.kr. Derudover har laboratoriet adgang til de fleste regionale egetrækronologier i Nordeuropa takket være et udstrakt samarbejde med de dendrokronologiske laboratorier ved Lunds - og Hamborgs Universitet.

Rapporten omfatter alle undersøgte prøver (daterede og udaterede). Der gives en summarisk redegørelse, efterfulgt af en kort karakteristik af hver enkelt prøve.

Ved daterede prøver oplyses det tidsspand, som de bevarede årringe dækker, samt træets fældningstidspunkt.

Hvis der er bark bevaret på prøven, eller hvis det er muligt, at fastslå om barkringen er bevaret, er det endvidere angivet, om træet er fældet om vinteren eller om sommeren. Barkringen er den sidst dannede årring i træets levetid og ligger umiddelbart under barken. Ved vinterfældning er barkringen færdigdannet, og træet må være fældet uden for vækstsæsonen, dvs. i oktober-april, mens sommerfældning angiver, at barkringen ikke er færdigdannet, og at træet er fældet i vækstsæsonen, maj-september.

Fældningstidspunkt - anvendelsestidspunkt - datering!

En dendrokronologisk dateringsundersøgelse giver oplysning om dannelsesstidspunktet for de undersøgte årringe, samt hvornår træet blev fældet. Alle undersøgelser viser, at under normale omstændigheder blev træet anvendt kort tid efter fældningen.

Det er f.eks. muligt at sammenligne dendrokronologiske og kulturhistoriske (skriftlige kilder, inskriptioner o.l.) dateringer. En undersøgelse som Hamborg Universitet har udført på knap 200 malerier på egetræspaneler, hvor kunstneren har signeret og dateret maleriet, viste, at der sjældent er gået mere end 5 år mellem fældningen af træet og fremstillingen af maleriet. Disse resultater understøttes af tilsvarende sammenligninger udført på bygningstømmer i Danmark. Ofte viser det sig, at fældningsår er sammenfaldende med anvendelsesår.

Spørgsmålet om lagring kan også besvares ud fra iagttagelser på de bevarede træstykker. Ved lagring af træ er det vigtigt at få fjernet bark og den yderste bløde del (splinten), som let bliver udsat for insekt- og rådgreb. Findes der derfor bark og intakt splintved på jordgravede stolper o.l., tyder det på, at de ikke har ligget ret længe, før de blev anvendt. Endvidere vil der, som følge af skrumpning under tørringen, uvægerligt opstå radiale sprækker (tørkeridser) i nyfældet træ, hvis det lagres i længere tid. Når træet derefter graves ned, fyldes disse sprækker med jord, hvorved de bliver let genkendelige, når træet senere undersøges. Mangler de, er det tegn på, at tømmeret er nedgravet i "frisk" tilstand.

En del formforandringer, som først kan være indtruffet efter træets forarbejdning, viser, at tømmeret er bearbejdet i "saftfrisk" tilstand. F.eks. bliver kvarttømmer, som oprindeligt er fremstillet med et retvinklet tværsnit, rombisk ved tørkesvind. Dette kan ofte iagttages ved tømmer i tagkonstruktioner.

Træ og i særlig grad egetræ lader sig nemmest bearbejde med håndværktøj (økser, kiler mm) i frisk tilstand. Efter flere års udtørring bliver egetræ så hårdt, at der ofte må maskindrevet værktøj til for at skære det igennem. Gennem hele vor forhistorie var kiler, skovøksen, bredbilen, stødøksen og skarøksen tømmerens vigtigste arbejdsredskaber. Værktøjsspor fra disse redskaber viser tydeligt, at træet er bearbejdet kort tid efter fældningen. For fortidens håndværkere har det ikke været et spørgsmål om at bruge vellagret tømmer, man at få træ, som specielt var velegnet til den opgave, de stod over for.

En datering af én enkelt prøve giver ikke en sikker datering af et helt bygningsværk (det være sig kirke, hus, borg, skib o.l.). Der kan være tale om genbrug, reparation etc. Har man derimod mange prøver fra den samme konstruktion, hvor den dendrokronologiske undersøgelse viser, at de har samme fældningstidspunkt, er der stor sandsynlighed for, at træerne er fældet ad hoc og anvendt med det samme. Endvidere er der mulighed for at tage hensyn til eventuelt genbrug af tømmer, reparationer, byggefasen og lignende.

Beregning af fældningstidspunkt

Muligheden for at opnå en præcis angivelse af fældningstidspunktet for egetræ afhænger af, om der er bark eller splintved bevaret på prøverne.

Splintveddet findes lige under barken og omfatter træets sidstdannede årringe. Hvis der er bark eller barkkant tilstede, betyder det, at barkringen er bevaret, og fældningstidspunktet kan derfor *angives præcist*. Er kun en del af splintveddet bevaret på prøven, kan fældningstidspunktet *beregnes med stor nøjagtighed*, idet det manglende antal årringe i splintveddet kan beregnes i de fleste tilfælde. Kan overgangen mellem kerne- og splintved konstateres, er det muligt at angive et omtrentligt tidspunkt, hvor fældnings-tidspunktet vil ligge, selvom intet af splintveddet er bevaret. Endelig kan både splintveddet og en del af kerneveddet mangle. I dette tilfælde er det kun muligt at *angive det tidligst mulige* fældningstidspunkt.

Til beregning af fældningstidspunktet anvendes en “splintstatistik” udarbejdet på grundlag af empiriske undersøgelser.

Der foreligger oversigter for egetræ fra Irland, England, Vesttyskland og Polen. Resultaterne varierer, men generelt gælder det, at jo større egenalder et egetræ har, jo flere årringe findes der i splintveddet, samt at “modne” egetræer (100-200 årige), som har vokset i Irland og England gennemsnitligt indeholder flere årringe (ca. 30) i splintveddet end træer, som har vokset i Vesteuropa (ca. 25), og at antallet af splintårringe aftager jo længere østpå, træerne har vokset (13-19 i Polen).

Forskningen vedrørende fastlæggelse af antallet af splintårringe i egetræ er i konstant udvikling, og der kan ikke gives noget entydigt svar på problemstillingen. HILLAM, J., MORGAN, R. A. and TYERS, I. G.: Sapwood estimates and the dating of short ring sequences. *Applications in Tree-ring Studies*, ed. R. G. Ward. BAR S333, 1987, 165-185, berører emnet generelt og anbefaler et tillæg for manglende splint på 10-55 år.

